

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

REGION AQUITAINE

GRANDES CULTURES

Ministère de l'Agriculture
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Chemin d'Artigues - 33150 CENON
Tél. 56 - 86 22 75

PUBLICATION PÉRIODIQUE N°ISSN
Régisseur d'Avances et de recettes 0763-7314
Direction départementale de l'Agriculture
CCP BORDEAUX 6702.46 X

BULLETIN TECHNIQUE N° 16 - VENDREDI 13 JUIN 1986



FRAISIER

- 40.50
4720
- * VARIETES TARDIVES BACHEES EN PLEINE RECOLTE : RENOUELER LE TRAITEMENT ANTI-BOTRYTIS.
 - * VARIETES DE PLEIN CHAMP - AU MEME STADE DE RECOLE QUE LES TARDIVES BACHEES : APPLIQUER UN TRAITEMENT CONTRE L'ANTHRACNOSE ET BOTRYTIS.
 - * VARIETES REMONTANTES, CULTURES INSTALLEES AU PRINTEMPS : RENOUELER LE TRAITEMENT CONTRE ZYTHIA, ANTHRACNOSE ET OIDIUM - SURVEILLER LES PUCERONS.

VARIETES PRECOSES ET DE SAISON BACHEES

Situation : Dans la région Aquitaine, la récolte est terminée et la plupart des fraisiéristes comptent tenir la culture en place une autre année.

Cependant dans la majorité des fraiseraies, des plants, 2 à 15 % de variétés Gorella et Elsanta en particulier, présentent un rougissement prononcé du feuillage suivi d'un affaïssement et d'un dessèchement de l'ensemble de la plante.

L'examen d'échantillon est en cours, un prochain bulletin fera état de la situation.

VARIETES TARDIVES BACHEES

Situation : La plupart des cultures sont en pleine récolte. Un développement de botrytis est observé sur sépales et fruits, favorisé par la période humide avec peu d'ensoleillement, de la dernière décade.

Préconisation : Pour les parcelles se situant au stade récolte en 1er ou 2ème ramassage sur 6 prévus, renouveler le traitement antibotrytis.

P.125

Abonnement annuel : 150 F

■ PLEIN CHAMP

Situation : Récolte en cours - La quantité et la qualité des fruits sont jugées satisfaisantes même pour les cultures de 2ème année. Toutefois chez certains fraisiéristes, l'absence d'une protection sanitaire suivie a permis à l'Anthracnose et au Botrytis de se développer interdisant parfois toute poursuite de récolte.

Préconisation : Cultures encore au stade récolte (2 ou 3ème passage) appliquer un traitement comportant en mélange un fongicide permettant de lutter :

- contre l'Anthracnose :

- . carbendazime (nombreuses spécialités)
- . captafol (DIFOSAN, ORTHODIFOLATAN)
- . captane (nombreuses spécialités)

- contre le Botrytis :

- . RONILAN
- . ROVRAL
- . SUMISCLEX (pour ce dernier produit, délai d'utilisation avant récolte de 7 jours).

■ CULTURES DE VARIETES REMONTANTES

Les plantations effectuées fin avril-début mai, présentent déjà une floraison alors que volume foliaire et enracinement sont encore très réduits. Dans ce cas supprimer ces fleurs en général de petite dimension.

PUCERONS

Situation : Installation des premières fondatrices sur jeunes feuilles dans toutes les régions de production.

Préconisation :

- Procéder à un examen sur plusieurs plants.
- Appliquer un produit spécifique lorsque l'on observe la présence de petites colonies sur les jeunes feuilles. (produits : voir bulletin n° 7 du 11 avril 1986).

ZYTHIA - ANTHRACNOSE ET OIDIUM

Situation : Ces maladies sont présentes dans la plupart des cultures de printemps. Le nouveau volume foliaire développé se trouve non protégé. Par ailleurs les arrosages pratiqués ont lessivé le précédent traitement.

Préconisation : Renouveler le traitement en associant un produit efficace contre ces différentes maladies.

Exemple : captafol (ORTHODIFOLATAN) + vinchlozoline (RONILAN).

.../...


FRAISIER - RESEAU OBSERVATEURS


Communes- 33

- . SAINT JEAN DE BLAINAC
- . SAINTE TERRE
- . SAINTE FOY LA GRANDE
- . CIVRAC SUR DORDOGNE
- . CASTETS EN DORTHE
- . PONDAURAT
- . MARCILLAC
- . PRIGNAC
- . SAUGON

Communes - 24

- . DOUVILLE
- . LE BUGUE
- . VILLAMBLARD
- . LALINDE
- . GARDONNE
- . RIBERAC
- . SAINT PIERRE D'EYRAUD


Station d'Aver-
tissements
agricoles



Communes - 47

- . AGEN
- . BOUGLON
- . TONNEINS
- . SAINTE LIVRADE
- . CASTELMORON
- . CANCON
- . MIRAMONT
- . LAFFITE SUR LOT
- . VILLENEUVE SUR LOT

OU ADRESSER LES ECHANTILLONS ?

**GROUPEMENT RÉGIONAL
D'INTÉRÊT SCIENTIFIQUE PHYTOSANITAIRE**

G.R.I.S.P. — Domaine de la Grande Ferrade — 33140 PONT DE LA MAYE

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

DATE DU PRÉLÈVEMENT :

ADRESSES : • de l'expéditeur _____

• du producteur _____

NOM DE LA PLANTE _____ **VARIÉTÉ :** _____

SYMPTÔMES OBSERVÉS ET LOCALISATION : racine, collet, tige, feuilles,
fleurs, fruits, généralisés à la plante entière :

RÉPARTITION DES PLANTES MALADES DANS LA PARCELLE : en taches,
au hasard, en ligne... pourcentage des plantes atteintes :

CONDITIONS CULTURALES : type de culture : plein champ, sous abris, hors
sol, mode d'irrigation, fumures... _____

PRINCIPAUX TRAITEMENTS PESTICIDES EFFECTUÉS (y compris les désin-
fections du sol et les désherbages, même à proximité des parcelles malades)
:

P.S. : Envelopper l'échantillon dans un papier journal, le tout introduit
dans un sac plastique.